

Coleção Química no Cotidiano

Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica

Volume 23



Sociedade Brasileira de Química



INTERNATIONAL YEAR OF
Quantum Science
and Technology

Heitor Avelino de Abreu

Renata Diniz

Breno Rodrigues Lamaghère Galvão

Mateus Augusto Martins de Paiva

A Mecânica Quântica no Cotidiano

E SUAS TECNOLOGIAS

Coleção Química no Cotidiano

Volume 23

A Mecânica Quântica no Cotidiano e suas tecnologias

Heitor Avelino de Abreu

Renata Diniz

Breno Rodrigues Lamaghery Galvão

Mateus Augusto Martins de Paiva



Editora *EditSBQ / PubliSBQ*

1ª Edição

São Paulo, Brasil | Sociedade Brasileira de Química | 2026

© Editora *EditSBQ* - Sociedade Brasileira de Química

Coleção Química no Cotidiano - A Mecânica Quântica no Cotidiano e suas tecnologias

Volume 23

¹Heitor Avelino de Abreu, ¹Renata Diniz, ²Breno Rodrigues Lamaghère Galvão e ³Mateus Augusto Martins de Paiva

¹Departamento de Química, Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG, Brasil.

²Departamento de Química, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG, Brasil.

³Departamento de Química, Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora-MG, Brasil.

Coordenadoras do projeto (Coleção Química no Cotidiano)

Claudia Moraes de Rezende e Hélio Anderson Duarte

Editora-chefe (Coleção Química no Cotidiano)

Claudia Moraes de Rezende

Arte gráfica e editoração (Coleção Química no Cotidiano)

Cabeça de Papel Projetos e Design(www.cabecadepapel.com) e *FluxoEdu* (www.fluxoedu.com.br)

Ficha Catalográfica
Wanda Coelho e Silva (CRB/7 46)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

A28q de Abreu, Heitor Avelino

A Mecânica Quântica no Cotidiano e suas tecnologias / Heitor Avelino de Abreu, Renata Diniz, Breno Rodrigues Lamaghère Galvão e Mateus Augusto Martins de Paiva – São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2026.
p.44 - (Coleção Química no Cotidiano, v. 23)

ISBN 978-85-64099-44-9

1. Química. 2. Quântica. I. Ferreira, Frederico. II. Título. III. Série.

CDD 547.7
CDU 547.9

Livro elaborado com finalidade didática. Proibida a sua comercialização

Prefácio

Vivemos cercados por tecnologia. Em casa, na escola, no transporte e na comunicação, utilizamos aparelhos e sistemas que parecem funcionar como mágica. Mas por trás de tudo isso, existe uma ciência poderosa, surpreendente e, por vezes, contraintuitiva: **a mecânica quântica**.

Este material foi pensado especialmente para alunos e professores do ensino médio com o objetivo de **aproximar a física moderna da realidade do nosso dia a dia**. Mais do que apresentar fórmulas ou conceitos abstratos, queremos mostrar como a mecânica quântica está **presente em tecnologias que usamos todos os dias**, mesmo que não nos demos conta.

O que é a mecânica quântica?

A mecânica quântica é a parte da física que estuda o comportamento das partículas muito pequenas, como elétrons, fótons (partículas de luz), átomos e moléculas. Nesse mundo microscópico, as regras são bem diferentes daquelas que vemos no nosso cotidiano. Por exemplo, um elétron pode se comportar como uma onda e uma partícula ao mesmo tempo.

Essas ideias parecem estranhas? Sim, e os próprios cientistas que criaram essa teoria — como Albert Einstein, Niels Bohr e Max Planck — também ficaram surpresos com os resultados. Mas, apesar do estranhamento inicial, a mecânica quântica foi sendo confirmada por experimentos e hoje é **uma das teorias mais bem testadas e confiáveis da ciência**.

Por que estudar mecânica quântica?

Mesmo sendo um tema que, à primeira vista, parece distante da vida cotidiana, a mecânica quântica é **a base de muitas das tecnologias modernas**. Computadores, celulares, sensores, aparelhos médicos, televisores e até o funcionamento do Sol envolvem princípios quânticos.

Além de ter sido útil para criarmos essas tecnologias, a mecânica quântica é a mãe da química moderna. Desde o ensino médio, devemos entender a química usando números quânticos e orbitais. Esses conceitos, e muitos outros, não existiam na química antes da mecânica quântica. Todo esse avanço também levou ao surgimento da química teórica, ou química computacional, área que revolucionou a forma de estudar e prever fenômenos moleculares, possibilitando o desenvolvimento de novos medicamentos, materiais inovadores e inúmeras outras aplicações científicas e tecnológicas.

Entender esses conceitos permite que tenhamos **uma visão mais crítica e consciente do mundo**, além de abrir portas para carreiras nas áreas de ciência, engenharia, saúde e tecnologia — todas fundamentais para o desenvolvimento da sociedade.

O que você vai encontrar neste material

Neste material, vamos apresentar **quatro aplicações importantes da mecânica quântica**: **Raios X** – Utilizados em exames médicos, os raios X mostram como a física quântica permite enxergar o interior do corpo humano sem cirurgias ou ver as moléculas que formam os cristais. **Efeito Fotoelétrico** – Quando a luz incide sobre certos materiais, ela pode arrancar elétrons. Esse fenômeno, explicado por Albert Einstein, é a base do funcionamento de **células solares**, por exemplo. **Transistores** – Presentes em praticamente todos os equipamentos eletrônicos, os transistores dependem de princípios quânticos para controlar a passagem de corrente elétrica. **Lasers** – Seja em leitores de código de barras, cirurgias oftalmológicas ou comunicação via fibra óptica, os lasers funcionam graças a um processo quântico de emissão de luz altamente controlada.

Esses tópicos serão apresentados com linguagem acessível, exemplos do cotidiano, imagens explicativas e sugestões de atividades, sempre respeitando o nível do ensino médio, mas sem deixar de lado a riqueza dos conceitos envolvidos.

A importância para a sociedade

Ao estudar essas aplicações, percebemos como o conhecimento científico transforma a sociedade. Tecnologias baseadas em mecânica quântica têm ajudado a melhorar a **saúde**, com diagnósticos mais precisos e tratamentos menos invasivos; ampliar a **comunicação**, com redes mais rápidas e eficientes; avançar na **produção de energia limpa**, como a energia solar e criar **novos materiais e dispositivos eletrônicos**, cada vez menores e mais potentes.

Mais do que entender como essas tecnologias funcionam, queremos despertar em você a **curiosidade científica**, o interesse por buscar respostas e o prazer de aprender algo novo — elementos essenciais para qualquer pessoa que deseja viver em um mundo em constante transformação.

Um convite à descoberta

A mecânica quântica não precisa ser um bicho de sete cabeças. Quando aproximamos seus conceitos da realidade, tudo começa a fazer sentido — e, mais do que isso, começa a **encantar**. Afinal, quem diria que o mesmo fenômeno que faz uma calculadora funcionar é também o responsável pela luz emitida pelas estrelas?

Convidamos você, estudante ou professor, a **mergulhar neste universo fascinante**. Com curiosidade, abertura e espírito investigativo, você vai perceber que a física não está apenas nos livros — ela está no seu celular, no consultório médico, no seu videogame, na lâmpada da sua casa e até no sorriso de alguém que acabou de aprender algo novo.

Boa leitura e boas descobertas!


Índice

Prefácio.....	3
Índice	6
Raios X: a ciência que deu olhos à medicina e fez o invisível salvar vidas	7
O Efeito Fotoelétrico: sem ele não haveria células solares, câmeras digitais ou sensores de luz	15
As origens do efeito fotoelétrico e a quebra de paradigmas na física	15
Como um gênio mudou as regras do jogo	16
Aplicações práticas de um fenômeno que mudou os caminhos da ciência	19
Transistores: Da mecânica quântica para os computadores	23
Os tubos de vácuo	24
Como os tubos de vácuo funcionam?	26
Os primeiros computadores eram feitos de tubos de vácuo.....	28
O nascimento dos transistores.....	29
A que ponto chegamos?	32
A invenção do laser: uma das aplicações mais versáteis da mecânica quântica, revolucionando áreas como telecomunicações, medicina e indústria.....	34
O balé dos elétrons: energia e emissão.....	35
Estados metastáveis: a arte da espera	37
O truque dos quatro níveis: a chave para a operação contínua	38
A receita do laser: os componentes de uma fábrica de luz	40
As qualidades extraordinárias da luz laser	41
Epílogo: o universo invisível que molda o nosso mundo.....	43

Raios X: a ciência que deu olhos à medicina e fez o invisível salvar vidas

As ciências quânticas estão presentes em nosso dia a dia de várias formas: na medicina quando realizamos exames de imagens, tais como radiografia de raios X, tomografia computadorizada e ultrassonografia, por exemplo; nos aparelhos eletrônicos, como computadores e celulares, e nas conexões com a internet por fibra óptica; além disso, nas ciências, quando utilizamos radiação para caracterizar materiais orgânicos e inorgânicos.

Os fundamentos quânticos são utilizados para explicar a interação entre a radiação eletromagnética e os materiais diversos. A radiação eletromagnética é composta por ondas formadas pela combinação de campos elétricos e magnéticos que se propagam. As várias energias da radiação são classificadas de acordo com o comprimento de onda (λ), formando o que denominamos de espectro eletromagnético, como mostrado na **Figura 1**. Cada faixa de energia apresenta uma aplicabilidade diferente, pois modifica o tipo de interação da radiação com a matéria. As ondas com comprimento de onda maiores apresentam menor energia e, portanto, a interação com a matéria é mais superficial. Quanto maior a energia, maior a interação com a matéria e mais penetrante é a radiação.



Fonte: Autoria própria.

Figura 1. Espectro eletromagnético da radiação

Utilizamos a radiação eletromagnética em vários setores, como em experimentos científicos de identificação de materiais, eletrodomésticos, exames médicos e em sistemas de segurança. As ondas de rádio, $\lambda > 10$ cm, são utilizadas em transmissão de dados e comunicação, como em aparelhos de rádio, televisão, telefones móveis, internet sem fio, *bluetooth*, sistemas de navegação, e satélites e em equipamentos médicos de Ressonância Magnética Nuclear (RMN). As imagens geradas em exames de RMN são muito úteis em diversos diagnósticos, tais como identificação de lesões em ligamentos, tumores, e análise dos órgãos do corpo como coração e cérebro. Micro-ondas (10 cm $> \lambda > 1$ mm) são radiações utilizadas em fornos de micro-ondas e a radiação infravermelho (1 mm $> \lambda > 780$ nm) em sensores de movimento, controle remoto, câmeras térmicas e sistemas de visão noturna. A luz visível (780 nm $> \lambda > 400$ nm) é a faixa do espectro eletromagnético que o olho humano consegue observar. Está presente na luz do sol, em lâmpadas

e em telas de dispositivos eletrônicos. A radiação ultravioleta ($400\text{ nm} > \lambda > 10\text{ nm}$) é utilizada principalmente em esterilização e desinfecção de superfícies, água e materiais. Essas radiações são denominadas de não ionizantes, ou seja, não possuem energia suficiente para gerar íons pela interação com a matéria. Radiações com comprimento de ondas menores do que 10 nm são denominadas de ionizantes e devem ser utilizadas de forma controlada e com pouca exposição, pois podem provocar alterações no DNA das células provocando mutações que aumentam a probabilidade de formação de células cancerígenas. Os raios X ($10\text{ nm} > \lambda > 0,01\text{ nm}$) e gama ($\lambda < 0,010\text{ nm}$) são as radiações ionizantes do espectro eletromagnético. As radiações ionizantes são utilizadas na medicina em diagnósticos por imagem, radioterapia e esterilização; e na ciência na determinação da estrutura molecular de sólidos, por exemplo.


Uma das radiações muito importantes na medicina de diagnóstico por imagem e na determinação estrutural de materiais é a radiação X, ou raios X. Essa radiação foi descoberta em 1895 pelo físico Wilhelm Conrad Röntgen, enquanto trabalhava com tubos de raios catódicos. A radiação observada por Röntgen era invisível, propagava em linha reta e afetava filmes fotográficos, semelhante à luz visível. Porém, essa nova radiação era muito penetrante, podendo atravessar o corpo humano, madeira e até pedaços de metais. Na época, a natureza dessa radiação era desconhecida e, portanto, recebeu o nome de radiação X, que utilizamos até hoje. Apesar do desconhecimento das propriedades da radiação, os raios X foram imediatamente empregados, em especial na radiologia.

A primeira radiografia da história foi realizada em 22 de dezembro de 1895 por Wilhelm Röntgen e retratava a mão esquerda de sua esposa, Anna Bertha. Pela descoberta, Röntgen foi agraciado com o prêmio Nobel em Física em 1901.

Com as radiografias é possível observar as estruturas internas do corpo, como ossos, órgãos e tecidos, para o diagnóstico de fraturas, infecções e tumores, por exemplo. Além da radiografia, podemos utilizar os raios X em vários diagnósticos por imagem, como em tomografias, mamografias e fluoroscopia, que auxiliam em diagnósticos de doenças e no tipo de tratamento.

Uma importante aplicação científica dos raios X é a determinação de estruturas cristalinas, tanto de compostos inorgânicos, como os minerais, quanto de orgânicos, como de medicamentos. Para essa finalidade, é necessário utilizar uma radiação com comprimento de onda específico que varia entre 0,5 e 1,6 Angstroms (Å), que corresponde a 10^{-10} metros. As radiações mais utilizadas para a determinação estrutural são as obtidas pela excitação/decaimento dos metais cobre ($\text{CuK}\alpha$, $\lambda = 1,54184 \text{ \AA}$) e molibdênio ($\text{MoK}\alpha$, $\lambda = 0,74073 \text{ \AA}$). O experimento que determina a estrutura cristalina de sólidos é denominado de difração de raios X. Os termos $\text{CuK}\alpha$ e $\text{MoK}\alpha$ são as linhas de decaimento radioativo quando os elétrons da camada eletrônica K subnível α dos metais Cu e Mo, respectivamente, são removidos quando uma diferença de potencial elétrico é aplicada no metal e em um filamento de Tungstênio.


Os sólidos cristalinos são materiais que possuem organização de longo alcance, ou seja, os átomos estão organizados da mesma maneira em todo o sólido. Se analisarmos qualquer parte do sólido observaremos a mesma distribuição dos átomos, formando as mesmas ligações químicas e interações intermoleculares. Esse arranjo vai se repetindo por todo o sólido de forma periódica. Como o arranjo é periódico, podemos definir a menor unidade de repetição do sólido, que é a célula unitária. Portanto o sólido é formado pelo empilhamento de células unitárias, como mostrado na **Figura 2**.



Fonte: Autoria própria.

Figura 2. Esquema de a) uma célula unitária e b) a propagação para formação do sólido cristalino.

Assim como as moléculas, os espaços vazios no sólido cristalino também são periódicos, e funcionam como uma rede de difração para os raios X. Os raios X difratados são combinados e geram o que denominamos de padrão de difração. A **Figura 3** representa um padrão de difração de um cristal formado pela interação entre um metal e uma molécula orgânica. Esse composto é chamado de complexo metálico. O tratamento matemático do padrão de difração fornece as posições atômicas das moléculas dentro da célula unitária e a partir desses dados podemos definir as distâncias entre átomos ligados (distância de ligação), ângulos de ligação e de torção, e a distância entre as moléculas interagentes. A força das ligações e das interações são inversamente proporcionais à distância entre os átomos envolvidos, portanto o conhecimento da geometria da molécula (distâncias de ligação e ângulos) permite definir o tipo de interação entre os átomos constituintes do composto analisado.




Fonte: Autoria própria.

Figura 3. Padrão de difração (foto) de um complexo metálico. a) Representação esquemática do experimento de difração de raios X por monocristal, b) padrão de difração obtido experimentalmente, c) tratamento matemático para interpretar o padrão de difração e obter a estrutura cristalina.

A interação da radiação com sólidos cristalinos é interpretada como um fenômeno de espalhamento e de difração. Pois ao interagir com a matéria, os raios X são desviados do seu caminho (espalhados) pela interação principalmente com os elétrons dos átomos do sólido. O ângulo formado entre a direção de incidência e a direção de espalhamento é chamado de ângulo difratado e com essa informação podemos definir as posições dos átomos que geraram esse desvio da radiação (padrão de difração). Porém, para determinarmos quimicamente o átomo,

precisamos utilizar a intensidade da radiação espalhada (difração). Para a descrição completa do sólido (quais são os átomos e suas respectivas posições) precisamos dos ângulos de espalhamento e das intensidades das radiações espalhadas. A estrutura cristalina de alguns materiais (inorgânicos e orgânicos) obtidas por difração de raios X estão mostradas na **Figura 4**.

O conhecimento da estrutura é muito importante para o entendimento das propriedades e aplicações que os materiais apresentam. Com o desenvolvimento das tecnologias dos equipamentos e dos programas de computadores utilizados no tratamento matemático dos dados de difração é possível obter estruturas tanto de moléculas simples como de estruturas complexas como as de proteínas. E o conhecimento da química quântica é fundamental nesse processo.



Fonte: Autoria própria.

Figura 4. Estruturas cristalinas de a) sal de cozinha (NaCl), b) quartzo, c) paracetamol e d) um complexo metálico de cobre. Os átomos em verde são de cloro, em roxo de sódio, vermelho de oxigênio, cinza de carbono, azul de nitrogênio, dourado de silício e branco de hidrogênio.


O Efeito Fotoelétrico: sem ele não haveria células solares, câmeras digitais ou sensores de luz

As origens do efeito fotoelétrico e a quebra de paradigmas na física

Apesar de o efeito fotoelétrico ter sido um fenômeno observado ainda no século XVIII, ele continua despertando interesse até hoje. Isso se deve em muito a ele ter mudado completamente a visão da humanidade acerca do universo, e ter contribuído de forma crucial para o surgimento da física moderna. Como se deu essa mudança? A resposta leva a outra pergunta: como a luz que é uma radiação eletromagnética, ou seja, uma onda, pode se comportar como uma partícula? A resposta para essa pergunta deve ser dada com toda uma contextualização histórica.

Em 1888, Heinrich Rudolf Hertz descobriu acidentalmente que uma placa de zinco carregada era rapidamente descarregada ao ser exposta à radiação ultravioleta. Essa foi a primeira observação do que chamamos de efeito fotoelétrico. Vale destacar que essa descoberta se deu 11 anos antes do descobrimento do elétron por Joseph John Thomson, em 1897. Nesse mesmo ano, Thomson confirmou que a radiação ultravioleta podia ejetar partículas carregadas negativamente, que posteriormente passaram a ser chamadas de elétrons. Em 1902, Philip Lennard, ex-aluno de Hertz, ***mostrou que a intensidade da luz incidente afetava diretamente o número de elétrons ejetados do material, porém, não exercia nenhuma influência sobre a energia dos elétrons ejetados. Entretanto, observou que quanto menor era o comprimento de onda da***

radiação incidente, maior era a energia dos elétrons ejetados. A **Figura 5** ilustra o fenômeno do efeito fotoelétrico.



Fonte: Autoria própria.

Figura 5. Representação do fenômeno do efeito fotoelétrico (a) e sua dependência com a intensidade da radiação incidente (b).

Como um gênio mudou as regras do jogo

No ano de 1921, Albert Einstein recebeu o Prêmio Nobel em Física. Ao contrário do que muitos acreditam, não foi por causa da teoria da relatividade, mas por seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico. Nesse estudo, Einstein utilizou ideias já propostas por Max Planck sobre a quantização da energia e as adaptou para explicar como a luz pode liberar partículas elétricas de certos materiais. Ele mostrou que a luz se comporta como uma onda, mas que sua energia não se espalha, e sim se concentra em pequenos “pacotes” chamados quanta de luz, com energia igual a $h\nu$, em que h é a constante de Planck ($h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J s}$), e ν é a frequência da onda luminosa. A equação 1 foi proposta por Einstein para descrever o efeito fotoelétrico.

$$h\nu = \phi + K_{\max} \quad (1)$$

Nessa equação, h é a constante de Planck, ν é a frequência da radiação luminosa, ϕ é a chamada função trabalho e K_{max} é a energia cinética máxima com que os elétrons são ejetados. O termo $h\nu$ se refere à energia contida nos pacotes de energia da radiação luminosa, os quais colidem com a superfície metálica. Parte dessa energia é consumida para a remoção do elétron da superfície, sendo que essa quantidade é conhecida como função trabalho (ϕ) e é característica de cada substância. A energia restante é convertida em energia cinética do elétron ejetado ($K_{max} = m_e \frac{v_e^2}{2}$). Os termos m_e e v_e se referem à massa e velocidade do elétron, respectivamente. O elétron ejetado recebe um nome específico, sendo chamado de *fotoelétron*.

Como a equação proposta por Einstein responde às questões ainda em aberto sobre o efeito fotoelétrico?


Questão 1. *Por que quanto menor o comprimento de onda da radiação incidente, maior é a energia do fotoelétron?*

De acordo com a concepção de Einstein, a energia da radiação luminosa está concentrada em um pequeno pacote de energia com valor igual a $h\nu$, que de forma análoga pode ser escrita como hc/λ , em que c é a velocidade da luz ($c = 2,998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$) e λ é o comprimento de onda da radiação incidente. Dessa forma, quanto menor o comprimento de onda da radiação incidente, maior será a energia do pacote de energia que colidirá sobre a matéria. Como parte dessa energia é gasta com a retirada do elétron da superfície (função trabalho), a energia residual será convertida em energia cinética do fotoelétron, fazendo com que quanto maior a energia da radiação incidente (menor comprimento de onda), maior será a energia cinética do elétron ejetado.

Questão 2. Por que a intensidade da radiação incidente não afeta a energia cinética dos fotoelétrons, mas sim a quantidade de elétrons ejetados da superfície?

Cada pacote de radiação luminosa possui energia específica ($E = h\nu$). Se essa energia não for suficiente para superar a energia necessária para ejetar os elétrons (função trabalho), o efeito fotoelétrico não ocorrerá. Mas caso a radiação possua energia suficiente para superar a função trabalho o efeito fotoelétrico ocorrerá. Além disso, a intensidade da radiação incidente está relacionada com a quantidade de fótons emitidos sobre a superfície. Então, ao invés de aumentar a energia cinética dos elétrons ejetados, o que ocorre é o aumento do número de elétrons ejetados, como pôde ser observado na **Figura 5**.

Com seu trabalho minucioso, Einstein, além de resolver o mistério do efeito fotoelétrico, trouxe para a humanidade uma visão nova e revolucionária sobre a natureza da radiação eletromagnética.



**1905
EFEITO
FOTOELÉTRICO**

Uma Curiosidade

Albert Einstein recebeu em 1905 o Prêmio Nobel em Física pelo seu trabalho sobre o ***Efeito Fotoelétrico***, e não pela Teoria da Relatividade.

Fonte: Autoria própria. Com auxílio de inteligência artificial.

Aplicações práticas de um fenômeno que mudou os caminhos da ciência

Ainda hoje temos diversas aplicações práticas do efeito fotoelétrico, as quais estão mais presentes em nossas vidas do que possamos imaginar. A capacidade de o efeito fotoelétrico conseguir criar uma corrente elétrica que é diretamente proporcional à intensidade da luz incidente (quanto maior o número de fótons incidentes, maior a quantidade de elétrons ejetados, e maior a corrente elétrica produzida) e a resposta extremamente rápida do efeito (ocorre a ejeção do elétron de forma muito rápida) lhe confere propriedades bastante interessantes para serem exploradas. Uma aplicação muito interessante e extremamente importante em nossa sociedade é em **dispositivos fotovoltaicos**, como **painéis solares (célula fotovoltaica)**.

Quando o material é atingido por fótons com energia maior que a função trabalho (ver equação 1, citada anteriormente) do material ocorre a ejeção de um elétron que dá origem a uma corrente elétrica. Nos painéis solares, este processo é adaptado para gerar eletricidade de forma contínua.

Uma célula fotovoltaica é um dispositivo que converte a energia da luz solar em eletricidade. Ela é fabricada em geral, a partir de silício, um material semicondutor, ou seja, um material que pode conduzir eletricidade sob certas condições. A estrutura básica de uma célula fotovoltaica é composta por três partes principais:

1. Camada tipo *n*: contém excesso de elétrons na camada externa (cargas negativas) devido à adição de impurezas doadoras, como fósforo.
2. Camada tipo *p*: contém deficiência de elétrons na camada externa (lacunas positivas) devido à adição de impurezas aceitadoras, como boro.


3. Junção *pn*: é a região de contato entre as duas camadas, em que se forma um campo elétrico interno que separa as cargas geradas pela luz.

Quando a luz solar incide sobre a célula fotovoltaica, os fótons transferem energia suficiente para libertar elétrons ligados nos átomos de silício. Nesse momento, inicia-se o processo fotovoltaico, no qual os pares elétron-lacuna gerados são separados pelo campo elétrico da junção *pn*, resultando em um fluxo de corrente elétrica que pode ser aproveitado externamente. Os materiais semicondutores são aqueles que possuem uma condutividade elétrica intermediária, não são bons condutores como, por exemplo, o cobre, nem são isolantes como o vidro. Uma de suas principais características é a capacidade de conduzir eletricidade que pode ser controlada, seja por temperatura, luz ou adição de impurezas ao material. De forma simplificada, um semicondutor do tipo *p* é um material com impurezas (dopagem) que possui mais buracos, denominados de portadores positivos, do que elétrons livres, os portadores negativos, para onde esses podem migrar. Já um semicondutor do tipo *n* é um material também com impurezas o qual possui mais elétrons livres do que buracos. A Figura 6 apresenta a diferença entre isolante, semicondutor e condutor, bem como os diferentes tipos de semicondutores, o intrínseco (aquele sem impurezas), tipo *p* e tipo *n*. O *bandgap* (ou lacuna de energia) é a quantidade mínima de energia que um fóton precisa ter para que um elétron consiga saltar da banda de valência para a banda de condução de um material.

Na banda de valência, os elétrons permanecem ligados aos átomos e não podem se mover livremente, o que impede a condução elétrica. Já na banda de condução, os elétrons se tornam livres para se deslocar pelo material, permitindo o fluxo de corrente elétrica.

Portanto, quando um fóton com energia igual ou superior ao *bandgap* é absorvido, ele fornece a energia necessária para libertar o elétron. Esse elétron,

agora livre, e a lacuna que ele deixa para trás, podem ser direcionados por um campo elétrico, como o que ocorre em uma célula fotovoltaica, originando a corrente elétrica. Um material isolante é caracterizado por um grande valor de *bandgap*, usualmente maior que 4 eV, o semicondutor apresenta um *bandgap* menor, com valores entre 0,5 e 3 eV, e os materiais condutores não apresentam *bandgap*, as bandas de valência e condução se sobrepõem.



Fonte: Autoria própria.

Figura 6. Ilustração esquemática dos tipos de materiais isolante, semicondutor e condutor, bem como os diferentes tipos de semicondutores.

As células solares são, em geral, instaladas nos telhados das casas, onde recebem bastante luz do Sol. Diferente do efeito fotoelétrico, as células solares aproveitam a luz solar comum para gerar eletricidade. Para que funcionem, a energia da luz que chega precisa ser maior que a energia necessária para liberar os elétrons do material semicondutor (*bandgap*). Quando isso acontece, os elétrons se movem dentro do material, criando uma corrente elétrica que pode ser usada de forma contínua.

Podemos ainda mencionar como dispositivos que utilizam os princípios do efeito fotoelétrico: as câmeras digitais (cada pixel do sensor gera elétrons quando atingido por fótons, e a intensidade da luz define a quantidade de elétrons, formando a imagem); os sensores de luz (detecção de presença ou ausência de luz, interruptores fotoelétricos como aqueles utilizados em postes de iluminação pública, que se acendem quando anoitece, e sistemas de segurança, onde os alarmes que disparam quando um feixe de luz é interrompido) e os controles remotos por infravermelho (conversão de pulsos de luz na região do infravermelho em sinais elétricos utilizando o efeito fotoelétrico).

Transistores: Da mecânica quântica para os computadores

Uma das invenções com maior impacto no mundo foi o telefone. Ele permitiu a comunicação à longas distâncias de uma maneira muito eficiente, e de uma hora para outra, pessoas em diferentes partes do globo podiam resolver problemas juntas, o que antes levava meses! Um dos nomes mais conhecidos nessa história foi Alexander Graham Bell. Em 1876, quando ele registrou a patente de um telefone que funcionava de verdade, parecia mágica! Mas para os nossos padrões de hoje, o aparelho dele era algo até bem simples, e nada muito tecnológico.

Naquela época, os eletrônicos ainda não eram parte da nossa vida, e também foi bem antes de alguém começar a pensar qualquer coisa sobre mecânica quântica. Então você pode estar se perguntando: o que isso tem a ver? Com certeza não precisamos de mecânica quântica para usar telefones fixos, certo? Bom, é verdade que foi possível chegar aos primeiros telefones sem a mecânica quântica. Mas quando a gente foi tentar melhorá-los, acabamos descobrindo coisas novas sobre como os materiais funcionam! Aí sim, sem a mecânica quântica, não seria possível avançar para a era da informação que conhecemos. Sem chance nenhuma.


No começo, os telefones eram bem difíceis de usar e apresentavam muitos problemas. Por exemplo, eles não tocavam quando alguém ligava. Então, quem fazia uma ligação precisava gritar até que a pessoa do outro lado percebesse que havia uma chamada! Além disso, não existiam aparelhos para medir o volume do som, a qualidade do sinal ou outros aspectos técnicos. Diante desses desafios, surgiram várias pesquisas para melhorar a tecnologia. Foi nesse contexto que nasceu a *Bell Labs*, uma empresa privada que se tornaria uma das maiores

responsáveis por avanços científicos — especialmente na área da mecânica quântica

Só para ter uma ideia da importância dessa empresa, nada menos que 11 Prêmios Nobel saíram da *Bell Labs*! Entre essas conquistas estão a comprovação experimental da dualidade onda-partícula — um dos conceitos centrais da mecânica quântica —, a invenção do transistor, que é a peça fundamental dos computadores e smartphones, o desenvolvimento do laser e até a primeira detecção da radiação cósmica de fundo, que está ligada à origem do universo. E isso é só uma parte dos feitos incríveis que nasceram lá!

Os tubos de vácuo

Para entender o que os telefones antigos têm a ver com transistores e a mecânica quântica, precisamos passar pelos **tubos de vácuo**. O sinal do telefone, que é transmitido por fios, ia ficando muito fraco com a distância, e era preciso usar algo para amplificar o sinal a cada tantos metros. E aqui entram os tubos de vácuo: eles eram capazes de amplificar um sinal (**Figura 7**). Foram eles que possibilitaram fazer chamadas a longas distâncias, inclusive as primeiras ligações intercontinentais.



Fonte: Autoria própria. Com auxílio de inteligência artificial.

Figura 7. Os tubos de vácuo podiam ser usados para amplificar um sinal de telefone.

Esses tubos eram simplesmente úteis demais, e estavam sendo usados em quase todos os eletrônicos que estavam aparecendo na época, como radar, rádio, televisão, e etc. É por causa deles que as televisões antigas eram chamadas de TV de tubo. E é por causa disso também, que o *youtube* tem esse nome. *Youtube* significa algo como “você vai televisionar”, só que ao invés da palavra televisionar, usaram a palavra *tube* (tubo em inglês) que era quase sinônimo!


O problema é que esses tubos eram muito delicados e difíceis de fabricar. Eles consumiam muita energia, esquentavam demais e quebravam com facilidade. Além disso, eram grandes, o que tornava impossível usar milhões deles em um aparelho pequeno, como um celular. Se alguém pudesse inventar algum dispositivo para amplificar sinal usando componentes elétricos sólidos, sem a parte de vidro e vácuo dos tubos, seria revolucionário para telefonia e para praticamente todos os aparelhos eletrônicos. E era justamente isso que os pesquisadores da *Bell labs*

estavam procurando quando inventaram o transistor, e só conseguiram isso porque eles sabiam muito de mecânica quântica!

Como os tubos de vácuo funcionam?

Vamos começar tentando entender o que esses tubos de vácuo eram, para podermos imaginar o que os pesquisadores da *Bell Labs* precisavam melhorar. Esses tubos se parecem com lâmpadas incandescentes (porque eles evoluíram a partir delas mesmo). As lâmpadas funcionam porque o filamento lá dentro esquentava tanto que começa a brilhar, feito carvão em brasa. Mas esse filamento não podia ficar exposto ao ar, porque senão o oxigênio do ar iria oxidá-lo e estragar tudo. Então era preciso guardar o filamento em um vidro transparente (para deixar a luz passar), e tirar quase todo o ar lá de dentro (fazer um vácuo). Quando alguém imagina uma lâmpada, que é símbolo de uma ideia boa, quase sempre imagina esse tubo brilhante com um filamento dentro.

Mas ao aquecer tanto e gerar luz, os elétrons do filamento ganham muita energia, e com isso podem querer “escapar”. Esse efeito, chamado de “efeito termiônico”, foi descoberto quase sem querer por Thomas Edison em 1880, quando ele tentava descobrir por que os filamentos da lâmpada incandescente se quebravam. Logo as pessoas viram que poderiam usar esse fenômeno para coletar a corrente elétrica gerada por esses “elétrons voadores”. Bastava colocar uma placa com carga positiva para puxar os elétrons e gerar corrente (**Figura 8**). Se a placa tivesse carga negativa, ela bloqueava a corrente. Um diodo é um componente elétrico que permite a passagem da corrente elétrica em apenas uma direção. Usando vários diodos juntos, é possível montar circuitos que controlam por onde a corrente pode ou não passar — como se fosse um sistema de ‘sim’ e ‘não’. Esses dois estados, passagem (1) e bloqueio (0), são a base do funcionamento dos computadores.



Fonte: Adaptado da figura https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Diode_vacuum_tube.png com permissão creative commons.

Figura 8. Esquema simplificado do funcionamento da emissão de elétrons por um filamento muito quente.


Note que o elétron ainda não havia sido descoberto nesta época. As pessoas estavam medindo a corrente elétrica produzida nos tubos sem pensar em partículas quânticas. Quando a corrente que passava pelo filamento era do tipo alternada (AC), esse dispositivo conseguia transformá-la em corrente contínua (DC). Ou seja, ele já funcionava como um retificador de corrente, convertendo a eletricidade de um tipo para outro!

Se fosse colocada uma fonte de energia também, como uma bateria, seria possível acelerar ainda mais os elétrons (logo, aumentar o sinal do telefone). Assim os tubos eram usados para receber o sinal elétrico fraco dos telefones, e aumentar a energia elétrica que estava ali, amplificando o sinal. Na época, muitas melhorias foram implementadas nesses tubos. A descrição acima, apesar de bem simplificada,

serve para dar uma visão geral sobre o que os tubos citados fazem, e por que eles foram tão úteis na época.

Os primeiros computadores eram feitos de tubos de vácuo

Esses tubos a vácuo são bons demais: podem aumentar um sinal fraco vindo de um telefone, mas também podem ser usados para controlar onde a eletricidade vai passar em um circuito, permitindo fazer o zero (sem corrente) e o um (com corrente) dos computadores. Os primeiros computadores eram feitos com vários desses tubos que podiam controlar o sinal, e logo fazer operações com zero e um. São os chamados **computadores de tubos de vácuo**. Pareciam uma coleção de lâmpadas! Observem a imagem na **Figura 9**, que mostra o primeiro computador programável, o ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Computer*). Ele tinha em torno de 17000 tubos, pesava 27 toneladas, e consumia uma quantidade enorme de energia, justamente por causa dos tubos, que esquentavam muito. Em média, aparecia um problema em um desses tubos a cada 2 dias.



Fonte: ARL Technical Library / U.S. Army e
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ENIAC_Penn2.jpg

Figura 9. ENIAC, o primeiro computador de uso geral do mundo e seus diversos tubos de vácuo. Foto: ARL Technical Library / U.S. Army

Se 17 mil tubos parecem muito em uma máquina, é porque eles eram grandes! Para comparar, um simples celular de hoje tem bilhões de transistores — e mesmo assim é leve e cabe na palma da mão. Ele tem um poder de processamento muito maior do que o ENIAC, aquele primeiro computador gigante. E tudo isso foi possível graças a quem?

O nascimento dos transistores

Apesar de extremamente importantes e usados em quase todos os aparelhos eletrônicos (telefone, televisão, rádio, computadores...), os tubos continuavam tendo dois defeitos difíceis de superar: o calor liberado e o tamanho. Muita energia era perdida na forma de calor, e por causa das altas temperaturas, eles tinham uma vida curta. Além disso, eles não podem ficar tão pequenininhos como os transistores.

Então, para ficar mais eficiente energeticamente e poder reduzir o tamanho dos dispositivos, era preciso um substituto dos tubos de vácuo que fizesse o mesmo papel, ou seja, permitir a passagem de corrente em apenas uma direção e permitir amplificar o sinal elétrico.

Alguns pesquisadores da *Bell Labs* estavam estudando silício no final da década de 1930, para uso em transmissão de rádio. Eles fundiam silício em temperaturas muito altas, e esperavam esfriar. Depois disso, eles obtinham algumas pequenas barras de silício que tinham pequenas rachaduras nas partes que haviam esfriado muito rápido, e os pesquisadores decidiram estudar com mais atenção. O curioso é que algumas dessas barrinhas deixavam a corrente elétrica passar em apenas uma direção, mas em outras, a corrente passava na direção oposta! E o mais estranho de tudo foi quando encontraram um pedaço que fazia as duas coisas

ao mesmo tempo: uma parte deixava a corrente fluir em uma direção e outra parte na direção contrária. Ninguém sabia explicar o porquê disso!

Eles resolveram dar nomes para essas partes diferentes. As partes que conduziam no sentido positivo foram chamadas de silício tipo **p**, e a outra de tipo **n** (negativa). Até hoje usamos esses nomes na área de semicondutores! Ninguém sabia por que aquilo acontecia, e nem qual era a diferença, quimicamente, entre os dois tipos de silício. Entretanto, em algum momento começou a ficar claro que os dois tipos eram o produto de quantidades minúsculas de impurezas.

Mas observem que curioso: apesar de que nenhum dos equipamentos que eles tinham na época conseguia detectar quais eram essas impurezas em quantidades minúsculas, quando eles cortavam o silício tipo **n** o nariz deles sentia cheiro de fósforo! Narizes melhores que equipamentos de metalurgia da época. Algum tempo depois identificaram que o silício tipo **p** possui pequenas quantidades de alumínio ou boro.

Por sorte, isso aconteceu na década de 1940, onde a mecânica quântica já tinha nascido para permitir que eles entendessem o que estava acontecendo. Pouca gente no mundo tinha estudado mecânica quântica, mas a *Bell Labs* tinha muitos físicos renomados. Se observarmos a tabela periódica, o silício tem 4 elétrons na sua camada mais externa (os chamados elétrons de valência). Quando o silício é dopado com fósforo — que tem 5 elétrons de valência —, ele ganha elétrons de valência extra, formando o chamado silício tipo **n**. Já quando ele é dopado com alumínio, que tem apenas 3 elétrons de valência, faltam elétrons em alguns lugares, criando o silício tipo **p**. Nessa época, os cientistas começaram a entender melhor a estrutura de bandas dos metais graças à mecânica quântica. Foi assim que conseguiram explicar por que o silício tipo **n** conduz eletricidade de um jeito diferente

do tipo **p**: o fósforo adiciona elétrons nessas bandas, e o alumínio cria "buracos" (falta de elétrons).

Hoje em dia, quando se produz esses materiais, em torno de 1 átomo de impureza é introduzido para cada 10 milhões de átomos de silício. Apesar do nome, as impurezas são muito desejadas, e são elas que permitem o controle da corrente elétrica no nível que os computadores usam.

O desenvolvimento desses novos materiais foi um trabalho de muitas pessoas. Costumamos pensar que as invenções acontecem da cabeça de um único gênio incompreendido, mas a realidade é que os grandes avanços são resultado de vários pequenos passos somados. Se não fossem os especialistas em metalurgia e químicos, por exemplo, as ideias da mecânica quântica para esses materiais nunca sairiam do papel.

Mas a gente não resiste, e gosta de ter um herói, né? Para a teoria quântica desses novíssimos materiais, que permitiram simplesmente todo o mundo eletrônico que temos hoje, o nome mais importante é provavelmente John Bardeen. Ele propôs uma teoria para os estados quânticos dos elétrons da superfície dos materiais. Isso foi fundamental, porque a condução de corrente nesses materiais acontece na superfície. Essa teoria (que é claro, fruto da mecânica quântica) guiou a equipe de físicos, e sem ela o sucesso não teria sido obtido.

O tão esperado dispositivo, que iria substituir os tubos de vácuo e permitir os computadores que temos hoje, apareceu no final de 1947. Os físicos John Bardeen e Walter Brattain, com a ajuda do eletroquímico Robert Gibney, desenvolveram uma solução eletrolítica que, em conjunto com o material semicondutor, ajudava os elétrons a superar a barreira dos estados de superfície!

Bardeen ganhou o prêmio Nobel de física duas vezes! Foi a única pessoa do mundo a fazer isso. Um dos prêmios foi junto com Brattain e Shockley, pela criação dos transistores (1956) e a segunda vez pela teoria microscópica da supercondutividade (1972), outra parte da mecânica quântica que viria a revolucionar a ciência para sempre!

A partir do protótipo inicial que foi feito para o transistor, inúmeras outras melhorias foram sendo feitas ao longo dos anos, de modo a criar transistores cada vez melhores e menores. Uma vez que os tubos de vácuo puderam ser abandonados, e a teoria dos estados quânticos de superfície estava bem estabelecida, estava aberto um novo caminho para chegar à revolução dos equipamentos eletrônicos que conhecemos.

A que ponto chegamos?

Quando dependíamos dos tubos de vácuo, tínhamos que gastar uma alta quantidade de energia para aquecer um filamento, e só uma pequena parte dessa energia ia para os elétrons e gerava corrente. Além da perda de energia na forma de calor, a temperatura alta era um péssimo subproduto do fenômeno elétrico, porque tendia a estragar tudo. Sem contar que o tamanho dos tubos fazia com que os computadores iniciais pesassem toneladas, e ocupassem o espaço de uma casa inteira.

Depois que os transistores foram desenvolvidos, alcançou-se uma eficiência energética muito maior e menos preocupação com o calor produzido. Mas o mais importante foi a **miniaturização**. O pequeno processador de telefone, que cabe em um bolso, tem bilhões de transistores, e permitem realizar cálculos na forma de zero e um da matemática binária em uma velocidade assustadora.

Os transistores de hoje têm poucos nanômetros (1 mm dividido em milhão de partes), e são menores que um vírus! Nem precisa falar que, para fazer esses materiais em escala industrial, é preciso uma tecnologia difícil de dominar, certo? Pouquíssimos lugares conseguem produzir os chips mais modernos, que vêm quase sempre de Taiwan (*TSMC*) e da Coreia do Sul (*Samsung*).

Toda vez que você abrir o celular só para ver um meme, ou mandar mensagem para alguém que está próximo de você, lembre-se que esse luxo só é possível graças a diversos avanços da ciência básica, como a mecânica quântica, e da ciência aplicada, como a ciência dos materiais que permite a gente manipular silício em escalas tão minúsculas.

A invenção do laser: uma das aplicações mais versáteis da mecânica quântica, revolucionando áreas como telecomunicações, medicina e indústria

Escondida dentro do leitor de Blu-Ray na sua sala, no scanner do caixa do supermercado ou viajando por cabos de vidro sob os oceanos para trazer esta informação, existe uma das tecnologias mais revolucionárias do século XX. O laser, hoje onipresente, teve um começo humilde. Criado em 1960 por pesquisadores da Bell Labs, foi inicialmente descrito como "uma solução em busca de um problema", uma invenção tão singular que suas aplicações ainda precisavam ser imaginadas. Essa jornada, da curiosidade de laboratório à ferramenta indispensável, é uma história fascinante de como o domínio da física quântica nos permitiu controlar a luz de uma forma sem precedentes.

Neste capítulo, exploraremos os princípios quânticos que tornaram o laser possível e como essa luz "disciplinada" remodelou nosso mundo.

Decodificando a luz: o significado por trás do nome

A própria palavra **LASER** é a chave para entender sua natureza. Não é um nome próprio, mas um acrônimo que detalha sua "receita" de funcionamento: **L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation. Traduzindo, significa **Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação**. Cada termo revela um

passo crucial: trata-se de pegar a **Luz** (Radiação eletromagnética) e **Amplificá-la**, ou seja, torná-la muito mais intensa. O método para isso é o coração quântico do processo: a **Emissão Estimulada**. É esse mecanismo único que diferencia a luz de um laser da luz caótica e desorganizada de uma lâmpada comum.

Anedota Histórica: Entre o “Maser Óptico” e o “Perdedor”

Antes do termo “laser” se popularizar, o físico Charles Townes referia-se à sua ideia como um “maser óptico”, uma extensão de seu trabalho anterior com micro-ondas. Foi o pesquisador Gordon Gould quem cunhou o acrônimo “laser”. A rivalidade entre os grupos tornou a escolha do nome uma pequena disputa. Em tom de brincadeira, o físico Arthur Schawlow sugeriu que, como o aparelho na verdade era um oscilador, o nome correto seria “LOSER” (Oscilação de Luz por Emissão Estimulada de Radiação). A piada, usando o termo “loser” (perdedor em inglês) arrancou risadas, mas o nome “laser” acabou se consolidando como o grande vencedor.

A engrenagem quântica do laser

Para construir um laser, é preciso manipular o comportamento dos átomos em um nível fundamental. A mecânica quântica nos mostra que, em sua essência, a matéria e as interações se baseiam no comportamento dos elétrons, na troca de energia e na emissão ou absorção de fótons.


O balé dos elétrons: energia e emissão

Para simplificar, vamos usar aqui o modelo de Bohr, mesmo sabendo que, quanticamente, os elétrons não seguem órbitas fixas e bem definidas. Imagine, então, que eles circulem o núcleo em trajetórias específicas, como planetas em um sistema solar quantizado, onde cada órbita corresponde a um nível de energia. A órbita mais interna, de menor energia, é a “zona de conforto” do elétron, seu

estado fundamental. Ao receber energia externa, ou seja, de uma descarga elétrica ou da luz de uma lâmpada, um elétron pode ser impulsionado para uma órbita mais distante, um **estado excitado**.

Contudo, esse estado é temporário. O elétron naturalmente "cai" de volta para um nível mais baixo e, para isso, libera a energia extra emitindo um fóton. Se isso ocorre de forma aleatória e desassistida, chamamos de **emissão espontânea**. É um processo caótico, que gera a luz difusa das lâmpadas e do sol.

O fundamento de funcionamento do laser veio de uma previsão de Albert Einstein: um átomo excitado pode ser induzido a liberar seu fóton. Se um fóton com a energia exata da transição passa por perto, ele age como um gatilho, estimulando o átomo a emitir um segundo fóton que é um clone perfeito do primeiro — mesma direção, mesma energia e ondas perfeitamente sincronizadas. Esse fenômeno, a **emissão estimulada**, é o segredo para criar a luz ordenada e coerente do laser (**Figura 10**).



Fonte: Autoria própria.

Figura 10. Contraste entre os processos de emissão. (a) Emissão espontânea: o fóton é liberado em direção e fase aleatórias. (b) Emissão estimulada: um fóton incidente provoca a liberação de um fóton idêntico e em fase, iniciando a amplificação.

Preparando o palco: a inversão de população

Para que a emissão estimulada funcione em cascata, é preciso superar um desafio. Na natureza, a maioria dos átomos prefere ficar em sua "zona de conforto", o estado fundamental. Assim, um fóton viajante tem mais probabilidade de ser absorvido por um átomo em repouso do que de estimular um átomo excitado.

A solução é criar um estado artificial chamado **inversão de população**, onde, em um determinado momento, há mais átomos no estado excitado do que no estado de menor energia para o qual eles decairão. É como encher o degrau de cima de uma escada com mais bolinhas do que o degrau de baixo. Somente sob essa condição um único fóton pode iniciar um efeito dominó, gerando uma avalanche de fótons idênticos que se transforma no feixe de laser.


Estados metastáveis: a arte da espera

Para que a emissão estimulada tenha chance de ocorrer, os átomos precisam permanecer no estado excitado por tempo suficiente. A maioria dos estados excitados dura apenas nanossegundos, um tempo curto demais para acumular uma quantidade significativa de átomos. A solução está em usar materiais cujos átomos possuam **estados metastáveis** — níveis de energia nos quais o elétron fica "preso" por um tempo muito mais longo, como microssegundos ou até milissegundos. Esse degrau energético "pegajoso" funciona como o nível superior do laser, permitindo que os átomos se acumulem ali, aguardando o estímulo para liberar sua luz.

O truque dos quatro níveis: a chave para a operação contínua

Para criar e manter a inversão de população de forma eficiente, os engenheiros de laser desenvolveram diferentes esquemas energéticos. No **laser de três níveis**, como o de rubi, os átomos são bombardeados para um estado de alta energia. Em seguida, eles decaem (retornam) rapidamente para um nível um pouco abaixo desse, chamado de nível superior metaestável – que, embora não seja o mais alto, possui vida longa o suficiente para permitir o acúmulo de átomos e viabilizar a emissão estimulada. A emissão do laser ocorre quando eles caem para o estado fundamental. O problema é que o estado fundamental está sempre cheio de átomos, exigindo uma energia de bombeamento imensa para excitar mais da metade deles e conseguir a inversão. Por isso, esses lasers geralmente operam em pulsos.

O **laser de quatro níveis** é muito mais eficiente. Nele, a transição do laser ocorre entre o nível superior metaestável e um nível inferior que está *acima* do estado fundamental. Esse nível inferior é projetado para se esvaziar rapidamente, com os átomos caindo para o estado fundamental. Como o nível inferior do laser está quase sempre vazio, é muito mais fácil criar e manter uma inversão de população, permitindo a operação contínua e estável do laser (**Figura 11**).




Fonte: Autoria própria.

Figura 11. Comparação entre lasers de três e quatro níveis. No laser de três níveis (esquerda), o processo termina no estado fundamental, dificultando a inversão de população. No laser de quatro níveis (direita), o processo termina em um nível intermediário que se esvazia rapidamente, facilitando a operação contínua.

A receita do laser: os componentes de uma fábrica de luz

1. **Meio de Ganho:** É o coração do laser. Pode ser um sólido cristalino (como o rubi ou o neodímio dopado com granada de ítrio e alumínio), um gás (como a mistura de hélio-neônio ou dióxido de carbono), um líquido (como corantes orgânicos) ou um semicondutor, o tipo mais comum hoje.
2. **Fonte de Energia (Bombeamento):** Para criar a inversão de população, é preciso "bombear" energia para o meio. Isso pode ser feito com lâmpadas de flash, que emitem pulsos de luz branca intensa, ou, de forma mais eficiente, com a luz de outro laser (geralmente um diodo de semicondutor) cujo comprimento de onda é precisamente sintonizado para ser absorvido pelo meio de ganho. Em lasers a gás, uma descarga elétrica cumpre esse papel.
3. **Cavidade Ótica Ressonante:** Consiste em dois espelhos posicionados nas extremidades do meio de ganho. Essa estrutura funciona como uma câmara de eco para fótons. A luz ricocheteia entre os espelhos, passando repetidamente pelo meio de ganho e sendo amplificada a cada passagem. Para otimizar a estabilidade, os espelhos são frequentemente curvos, o que ajuda a manter os raios de luz alinhados e a minimizar perdas. Uma fração controlada da luz intensa escapa pelo espelho parcialmente transmissor, formando o feixe de laser (**Figura 12**).



Fonte: Autoria própria.

Figura 12. Esquema do funcionamento interno de um laser. a) A fonte de energia excita o meio de ganho, criando a inversão de população. b) c) d) Os fótons são amplificados em um efeito cascata enquanto refletem entre os espelhos da cavidade ótica. e) f) O feixe de laser é a parte da luz que escapa de forma controlada de um sistema em equilíbrio da câmara de ressonância ou cavidade ótica.

As qualidades extraordinárias da luz laser

O processo de emissão estimulada e amplificação ressonante confere ao feixe de laser três propriedades notáveis:

- **Monocromaticidade:** A luz do laser é extremamente pura em termos de cor. Enquanto uma lâmpada comum emite um arco-íris de comprimentos de onda, um laser emite fótons de um comprimento de onda muito bem definido, resultando em uma cor única e precisa.
- **Coerência:** Esta é talvez sua propriedade mais fundamental. Todos os fótons no feixe de laser oscilam em perfeita sincronia, com as cristas e

vales de suas ondas alinhados. É como comparar o barulho de uma multidão (luz normal) ao som de um coral cantando a mesma nota em uníssono (luz laser).

- **Direcionalidade:** O feixe de um laser se propaga em uma linha quase perfeitamente reta, com uma dispersão (divergência) muito pequena. Isso permite concentrar uma grande quantidade de energia em um ponto muito pequeno, mesmo a grandes distâncias.

O impacto da luz disciplinada: aplicações no mundo real

A pureza e o controle da luz laser abriram portas para avanços em inúmeros campos.

Na medicina, o laser tornou-se um bisturi de luz, permitindo cirurgias de altíssima precisão que minimizam danos a tecidos vizinhos e reduzem sangramentos. Ele é fundamental em procedimentos oftalmológicos para correção de visão e tratamento de doenças da retina.

Na indústria e tecnologia, feixes poderosos cortam chapas de aço com a mesma facilidade com que gravam códigos de barras minúsculos em componentes eletrônicos. Essa precisão é vital na fabricação de tudo, de carros a smartphones.

Nas comunicações e ciência, o laser é a espinha dorsal da internet global. Sinais de luz piscando bilhões de vezes por segundo viajam por cabos de fibra ótica, conectando o planeta. Em laboratórios, sua precisão permite aos cientistas detectar ondas gravitacionais e manipular átomos individualmente, expandindo as fronteiras do conhecimento.

O laser é mais do que uma luz brilhante; é a manifestação de um profundo entendimento sobre a natureza quântica da realidade. Ele representa o poder da curiosidade humana para transformar conceitos abstratos, como os níveis de energia de um elétron, em tecnologias que definem nossa civilização. Cada feixe de laser em ação no mundo é um lembrete de que as regras que governam o universo invisível dos átomos, quando compreendidas, nos dão ferramentas para remodelar o mundo visível.

Epílogo: o universo invisível que molda o nosso mundo

Ao longo destas páginas viajam do invisível dos raios X à precisão quase mágica dos lasers; exploramos como o efeito fotoelétrico abriu caminho para tecnologias que colhem energia do Sol, vimos como a descoberta e o domínio dos semicondutores permitiram a criação dos transistores, que por sua vez se tornaram o coração de cada computador, celular e dispositivo inteligente.

Por trás de cada uma dessas revoluções há um fio condutor: a mecânica quântica. Uma teoria que nasceu para explicar o comportamento estranho de partículas microscópicas, mas que acabou redesenhando o mundo macroscópico que habitamos.

A história que contamos aqui mostra que grandes avanços não surgem

apenas de laboratórios isolados, mas de gerações de cientistas, engenheiros e visionários que ousaram fazer perguntas diferentes e persistiram até encontrar respostas. Cada descoberta que parecia “uma solução em busca de um problema” acabou encontrando seu lugar, transformando a sociedade de maneiras profundas.

E a jornada está longe de terminar. A mesma física que nos deu o laser, os transistores e as imagens de alta resolução, hoje alimenta pesquisas em computação quântica, novos materiais, energias limpas e até na busca por entender a origem do próprio universo.

Se existe uma lição que a ciência nos ensina é que a curiosidade é um dos motores mais poderosos da humanidade. Ao questionarmos, experimentamos e conectamos ideias, não apenas desvendamos o funcionamento do mundo, nós o recriamos.

Que este livro tenha despertado em você a vontade de continuar explorando, perguntando e se maravilhando. Porque, no fim, a mecânica quântica não é apenas sobre elétrons, fótons ou fótons alinhados em um feixe de laser. Ela é sobre entender que o invisível está sempre moldando o visível, e que o conhecimento é a nossa melhor ferramenta para iluminar o desconhecido.

Para Saber Mais

As informações técnicas e históricas apresentadas neste capítulo foram adaptadas para uma linguagem acessível. Para um aprofundamento completo sobre os assuntos abordados neste livro sugerimos as seguintes referências:

Raios X

Santin, O. *Química Nova* **1995**, 18 (6) 574-583. “Breve Histórico dos Cem Anos da Descoberta dos Raios X: 1895-1995”.

Borisov, S. V.; Podberezskaya, N. V. *Journal of Structural Chemistry* **2012**, 53(1-suppl) 1-3. “X-ray diffraction analysis: A brief history and achievements of the first century”. DOI: 10.1134/S0022476612070013.

Efeito Fotoelétrico

Jho, H.; Lee, B.; Ji, Y.; Ha, S. *European Journal of Physics* **2023**, 44 (2). “Discussion for the enhanced understanding of the photoelectric effect”. DOI: 10.1088/1361-6404/acb39d.

Transistores

Gertner, J.; *The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American Innovation*; Penguin Books, 2013.

Laser

HECHT, Jeff. *Understanding Lasers: An Entry-Level Guide*. 4ª ed. Hoboken, Wiley, 2019.



Uma produção SBQ - Sociedade Brasileira de Química

www.s bq.org.br

